

## Conduite à tenir autour d'un cas de rougeole

### Vaccination autour d'un cas de rougeole

#### **Nourrissons âgés de 6 à 11 mois révolus :**

une dose de vaccin trivalent dans les soixante-douze heures suivant le contact présumé. Pour les nourrissons entre 6 et 8 mois révolus, la vaccination requiert le recours à une recommandation temporaire d'utilisation (RTU).

Si cette vaccination n'a pas été effectuée dans ce délai : indications d'immunoglobulines.

La vaccination ultérieure contre la rougeole suit les recommandations générales (une dose à 12 mois et une dose entre 16 et 18 mois).

#### **Personnes âgées d'au moins 1 an et nées**

**depuis 1980 :** une dose de vaccin trivalent dans les soixante-douze heures suivant le contact présumé et mise à jour de la vaccination conformément au calendrier vaccinal pour atteindre deux doses de vaccin contenant la rougeole.

**Professionnels de santé ou personnels de la petite enfance** sans antécédent de rougeole et/ou n'ayant pas reçu deux doses : une dose de vaccin trivalent quel que soit leur âge.

## Recommandations chez les professionnels de santé et de la petite enfance

Personnels de la petite enfance et professionnels de santé, en formation, à l'embauche ou en poste.

Personnels des services accueillant des patients à risque de rougeole grave (immunodéprimés, femmes enceintes, pédiatrie, etc.) doivent être vaccinés en priorité.

**Nés depuis 1980 :** mise à jour du calendrier vaccinal selon les recommandations générales (cf. plus haut).

**Nés avant 1980** non vaccinés, sans antécédent de rougeole ou dont l'histoire est douteuse : une dose de vaccin trivalent.