

Tableau récapitulatif des vaccinations pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Vaccins contre	Schéma vaccinal
Diphtérie (d) Tétanos (T) Poliomyélite (Polio)	Rappel à 65, 75, 85 ans, etc.
Grippe	1 dose annuelle.
Zona	1 dose unique. La vaccination est recommandée chez les adultes âgés de 65 à 74 ans révolus. Ce vaccin vivant atténué est contre-indiqué chez les personnes immunodéprimées.
Pneumocoque	<p>Adultes à risque élevé d'infection invasive à pneumocoque</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Non antérieurement vaccinés : 1 dose de VPC13 ; suivie d'1 dose de VP23 huit semaines plus tard. ▪ Vaccinés depuis plus d'un an avec VP23 : 1 dose de VPC13. Revaccination par VP23 avec un délai d'au moins cinq ans après le dernier VP23. ▪ Vaccinés antérieurement avec la séquence VPC13-VP23 : 1 dose de VP23 avec un délai d'au moins cinq ans après le dernier VP23.
Coqueluche acellulaire (ca)	<p>Pour les personnes antérieurement vaccinées à l'âge adulte et à nouveau en situation de cocooning : 1 dose de dTcaPolio. Revaccination si la dernière dose de vaccin coquelucheux date de plus de 10 ans (délai minimal de un mois entre 1 dose de dTPolio et 1 dose de dTcaPolio).</p> <p>Pour les personnes non vaccinées à l'âge adulte et en situation de cocooning : 1 dose de vaccin dTcaPolio.</p>
Hépatite A	<p>Pour les personnes exposées à un risque particulier : 2 doses selon le schéma : 0,6 mois Si la personne est née avant 1945, une sérologie préalable est fortement recommandée, à la recherche d'anticorps témoins d'une immunité ancienne.</p>