



## 结核病疫苗（卡介苗）

针对结核病高危儿童，通常建议从1个月大开始接种结核病疫苗，直到15岁为止。

## 白喉-破伤风-脊髓灰质炎疫苗 (DTP)

建议成人的疫苗补种在25、45、65岁等固定年龄进行，之后每十年接种一次。

## 百日咳

建议成人预防百日咳的疫苗补种在25岁时进行，到39岁之前仍是可行的。建议孕妇在怀孕从第4个月起接种百日咳疫苗，以保护新生儿。

## B型流感嗜血杆菌疫苗 (Hib)

对于6个月前未接种过疫苗的儿童，可以使用单价疫苗进行补种，补种年龄范围直至5岁（1至3剂，视年龄而定）。

## 乙型肝炎疫苗

如果出生第1年内未进行疫苗接种，那么可以在15岁（含）之前接种。16岁及以上人群，仅建议处于乙型肝炎风险中的人接种。

## 肺炎球菌疫苗

大于24个月的人群，建议有风险的儿童和成人接种此疫苗。

## 麻疹-腮腺炎-风疹疫苗 (MMR)

对于1980年后出生的人来说，完成最新的接种意味着已经接种了两剂疫苗。

## C型脑膜炎球菌疫苗

从12个月大到24岁（含），如果尚未接种疫苗，建议单剂接种。

## 轮状病毒疫苗

建议所有2个月以上的婴儿接种。根据不同的疫苗类型，需要两到三剂（口服）。

## B型脑膜炎球菌疫苗

对于在3、5和12个月大时未接种三剂推荐疫苗的婴儿，可以在2岁之前进行补种。

## 人乳头瘤病毒 (HPV)

建议11至14岁的女孩和男孩接种疫苗，补种年龄不超过19岁（含）。此外，建议26岁以下的男同性恋者 (MSM) 接种疫苗。

## 流感疫苗

建议每年接种疫苗，特别是对于有并发症风险的人群：65岁及以上的老年人、某些慢性病患者，包括6个月以上的儿童、孕妇和肥胖症患者（BMI > 40 kg/m<sup>2</sup>）。从现在开始，建议所有2岁至17岁的儿童全部接种流感疫苗。

## 带状疱疹疫苗

建议65至74岁（含）的人群接种疫苗。

## 新冠疫苗接种

在 [vaccination-info-service.fr](http://vaccination-info-service.fr) 网站上查找最新的疫苗接种时间表

了解更多信息



Le site de référence qui répond à vos questions

