

Figure 1. Schéma de vaccination autour d'un cas d'IIM de sérotype A, Y ou W.

Age de l'enfant	Schéma de vaccination
6 semaines à 4 mois	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 dose de Nimenrix® ▪ Par la suite, vaccination antiméningococcique selon les recommandations du calendrier vaccinal (1 dose de Neisvac® à 5 mois, rappel à 12 mois). Respecter un délai de 1 mois entre la vaccination avec le Nimenrix® et le Neisvac®.
5 mois	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si non vacciné contre le méningocoque de sérotype C : 1 dose de Nimenrix®, Neisvac® un mois plus tard et rappel Neisvac® à 12 mois. ▪ Si vacciné contre le méningocoque de sérotype C : 1 dose de Nimenrix® rappel de Neisvac® à 12 mois.
6 mois à 11 mois révolus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si non vacciné contre le méningocoque de sérotype C : une dose de Nimenrix®, Neisvac® un mois plus tard puis rappel Neisvac® au cours de la 2^{ème} année (délai de 6 mois entre les 2 doses). ▪ Si vacciné contre le méningocoque de sérotype C : 1 dose de Nimenrix® rappel de Neisvac® à 12 mois.
12 mois	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non vacciné contre le méningocoque de sérotype C : une dose de Nimenrix® puis rien. ▪ Vacciné contre le méningocoque de sérotype C à 1 dose : une dose de Nimenrix puis rien.
12 mois à 24 ans révolus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 dose de Nimenrix® (ou Menveo® après 2 ans)* si la personne n'était pas vaccinée C, elle sera considérée comme à jour après cette dose. ▪ Vaccinée avec un vaccin quadrivalent conjugué depuis < 5 ans : pas de rappel. ▪ Vaccinée avec un vaccin quadrivalent conjugué depuis ≥ 5 ans : 1 dose de Nimenrix® ou Menvéo®. ▪ Vacciné avec un vaccin quadrivalent polysidique non conjugué depuis < 3 ans : pas de rappel. ▪ Vacciné avec un vaccin polysidique non conjugué A+C depuis < 3 ans : <ul style="list-style-type: none"> → Si contact avec IIM A : pas de vaccin. → Si contact avec IIM Y ou W : 1 dose de Nimenrix® ou Menvéo®. ▪ Vacciné avec un vaccin polysidique non conjugué (A+C ou ACYW) depuis ≥ 3 ans : 1 dose de Nimenrix® ou Menvéo®. <p><i>* que la personne ait été ou non vaccinée contre le méningocoque de sérotype C.</i></p>
25 ans et plus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 dose de Nimenrix (ou Menveo après 2 ans)* si la personne n'était pas vaccinée C, elle sera considérée comme à jour après cette dose. ▪ Vaccinée avec un vaccin quadrivalent conjugué depuis < 5 ans : pas de rappel. ▪ Vaccinée avec un vaccin quadrivalent conjugué depuis ≥ 5 ans : 1 dose de Nimenrix® ou Menvéo®. ▪ Vacciné avec un vaccin quadrivalent polysidique non conjugué depuis < 3 ans : pas de rappel. ▪ Vacciné avec un vaccin polysidique non conjugué A+C depuis < 3 ans : <ul style="list-style-type: none"> → Si contact avec IIM A : pas de vaccin. → Si contact avec IIM Y ou W : 1 dose de Nimenrix® ou Menvéo®. ▪ Vacciné avec un vaccin polysidique non conjugué (A+C ou ACYW) depuis ≥ 3 ans : 1 dose de Nimenrix® ou Menvéo®. <p><i>* que la personne ait été ou non vaccinée contre le méningocoque de sérotype C.</i></p>