

Figure 2. Schéma de vaccination autour d'un cas d'ILM de sérotype C.

Age de l'enfant	Schéma de vaccination
6-7 semaines	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 dose de Nimenrix®.</li> <li>Par la suite, vaccination antiméningococcique selon les recommandations du calendrier vaccinal (1 dose de Neisvac® à 5 mois, rappel à 12 mois).</li> </ul>
2-3 mois révolus	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 dose de Neisvac® ou de Menjugate®. Seconde dose 2 mois plus tard puis, rappel à 12 mois*.</li> <li>Si déjà vacciné avec le Nimenrix® (enfant voyageur ou autour d'un cas) : Neisvac® ou Menjugate®, 2<sup>ème</sup> dose 2 mois plus tard puis rappel à 12 mois.</li> </ul>
4 mois	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 dose de Neisvac® ou 2 doses de Menjugate® à 2 mois d'intervalle rappel à 12 mois.</li> <li>Si déjà vacciné avec le Nimenrix® (enfant voyageur ou autour d'un cas) : Neisvac® ou Menjugate®, 2<sup>ème</sup> dose 2 mois plus tard puis rappel à 12 mois.</li> </ul>
5 mois	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si non vacciné contre le méningocoque C : 1 dose de Neisvac® ou 2 doses de Menjugate® à 2 mois d'intervalle et rappel à 12 mois.</li> <li>Si déjà vacciné (Neisvac®) : Pas de vaccination, rappel à 12 mois.</li> <li>Si déjà vacciné avec le Nimenrix® (enfant voyageur ou autour d'un cas) : Neisvac® ou 2 doses de Menjugate® à 2 mois d'intervalle puis rappel à 12 mois.</li> </ul>
6 mois à 11 mois révolus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si non vacciné contre le méningocoque de sérotype C : 1 dose de Neisvac® ou 2 doses de Menjugate® à 2 mois d'intervalle. Rappel au cours de la 2<sup>ème</sup> année (délai de 6 mois après la précédente injection).</li> <li>Si déjà vacciné contre le méningocoque de sérotype C avec un vaccin monovalent : Pas de vaccination. Par la suite rappel (Neisvac® ou Menjugate®) 6 mois après la précédente injection*.</li> <li>Si vacciné avec le Nimenrix® : 1 dose de Neisvac® ou 2 doses de Menjugate® à 2 mois d'intervalle. Rappel à au cours de la 2<sup>ème</sup> année (délai de 6 mois par rapport à la précédente injection).</li> </ul>
12 mois	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non vacciné avec un vaccin monovalent C : 1 dose de vaccin monovalent même si antérieurement vacciné avec Nimenrix®.</li> <li>Vacciné avec un vaccin monovalent C à 1 dose depuis moins de 6 mois : pas de vaccination, 2<sup>o</sup> dose à réaliser 6 mois après la précédente injection ; si vacciné depuis plus de 6 mois : vaccination avec un vaccin monovalent C.</li> </ul>
12 mois à 24 ans révolus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vacciné contre le méningocoque de sérotype C avec un vaccin conjugué** depuis &lt; 5 ans : pas de rappel.</li> <li>Vacciné contre le méningocoque de sérotype C avec un vaccin conjugué depuis ≥ 5 ans : rappel C conjugué.</li> <li>Vacciné avec un vaccin polysidique non conjugué contenant la valence C*** depuis &lt; 3 ans : pas de rappel.</li> <li>Vacciné avec un vaccin polysidique non conjugué depuis ≥ 3ans : rappel C conjugué.</li> <li>Non vacciné C : 1 dose de C conjugué.</li> </ul>
25 ans et plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vacciné contre le méningocoque de sérotype C avec un vaccin conjugué** depuis &lt; 5 ans : pas de rappel.</li> <li>Vacciné contre le méningocoque de sérotype C conjugué depuis ≥ 5 ans : rappel contre avec un vaccin conjugué contre le méningocoque C.</li> <li>Vacciné avec un vaccin non conjugué contenant la valence C*** depuis &lt; 3 ans : pas de rappel.</li> <li>Vacciné avec un vaccin non conjugué contenant la valence C depuis ≥ 3ans : rappel C conjugué.</li> <li>Non vacciné C : 1 dose de vaccin monovalent C conjugué.</li> </ul>

\* Il est préférable d'effectuer le rappel avec le même vaccin.

\*\* Vaccin monovalent C ou tétravalent conjugué ACYW.

\*\*\* Vaccin bivalent A+C ou vaccin non conjugué ACYW (MenCvax).