

Tableau des recommandations vaccinales pour les patients adultes transplantés d'organe solide, en pré- et en post-transplantation.

Vaccins	Recommandations en pré-greffe	Recommandations en post-greffe
Vaccins vivants		
Varicelle	Si séronégatif, vacciner avec un délai minimal de quatre semaines avant la greffe. Deux injections espacées de quatre à huit semaines.	Contre-indiqué
Zona	Si âge entre 65 et 74 ans, vacciner avec une injection unique.	Contre-indiqué
ROR	Pour les patients non immuns, vacciner dans un délai de quatre semaines avant la greffe. Deux injections espacées de quatre semaines.	Contre-indiqué
Fièvre jaune	Si le patient est amené à résider ou à voyager en zone d'endémie après la greffe et si séronégatif. Une injection avec un délai minimal de quatre semaines avant la greffe.	Contre-indiqué
Vaccins inactivés		
dTPca*	Même recommandation qu'en population générale.	Rappel dTP tous les dix ans
Pneumocoque	Une dose de vaccin conjugué 13-valent, suivie d'une dose de vaccin non conjugué 23-valent espacée d'au moins deux mois.	Une dose de vaccin conjugué 13-valent, suivie d'une dose de vaccin non conjugué 23-valent espacée d'au moins deux mois.
Hépatite B	Chez une personne transplantée non immunisée (Ag HBs, anticorps anti-HBs et anti-HBc négatifs) : trois injections double-dose (40 µg) espacées d'un mois et une 4e injection double-dose quatre mois après la 3e injection (schéma M0, M1, M2, M6). Contrôle des taux d'anticorps anti-HBs après la vaccination.	Si sérologie VHB négative, vaccination possible à partir du 6e mois après la greffe : trois injections double-dose (40 µg) espacées d'un mois et une 4e injection double-dose quatre mois après la 3e injection (schéma M0, M1, M2, M6).
Hépatite A	Si IgG anti-VHA négatives et hépatopathie chronique : une dose avec rappel à six mois.	Si IgG anti-VHA négatives et hépatopathie chronique : une dose suivie d'un rappel à six mois.
Méningocoque C conjugué	Une dose de vaccin jusqu'à l'âge de 24 ans révolus.	Une dose de vaccin jusqu'à l'âge de 24 ans révolus.
HPV <i>(Papillomavirus humain)</i>	Chez la jeune fille dès l'âge de 9 ans et jusqu'à 19 ans : schéma à trois doses. Chez le garçon à partir de l'âge de 9 ans avec un rattrapage possible jusqu'à 19 ans : schéma à trois doses.	Chez la jeune fille dès l'âge de 9 ans et jusqu'à 19 ans : schéma à trois doses. Chez le garçon à partir de l'âge de 9 ans avec un rattrapage possible jusqu'à 19 ans : schéma à trois doses.
Grippe saisonnière	Une injection annuelle.	Une injection annuelle, à partir de six mois après la greffe.

*diphtérie-tétanos-poliomyélite-coqueluche acellulaire