

Une anaphylaxie est probable quand **l'une de ces trois situations cliniques** apparaît brutalement :

Situation 1

Installation aiguë d'une atteinte cutanéomuqueuse de type urticarienne^a
ET au moins un des éléments suivant :

- atteinte respiratoire^b
- hypotension artérielle ou signe de mauvaise perfusion d'organes^c

Situation 2

Au moins **deux** des éléments suivants apparaissant rapidement :

- atteinte cutanéomuqueuse^a
- atteinte respiratoire^b
- hypotension artérielle ou signes de mauvaise perfusion d'organes^c
- signes gastro-intestinaux persistants (douleurs abdominales, vomissements, etc.)

Situation 3

Hypotension artérielle :

- de 1 mois à 1 an, PAS < 70 mmHg
- de 1 à 10 ans, PAS < 70 + (2 × âge) mmHg
- de 11 à 17 ans, PAS < 90 mmHg
- adulte, PAS < 90 mmHg ou baisse de plus de 30% par rapport à sa valeur habituelle

PAS : pression artérielle systolique.

a Éruption généralisée, prurit, flush, œdème des lèvres, de la langue ou de la luette, etc.

b Dyspnée, bronchospasme, hypoxémie, stridor, diminution du débit expiratoire de pointe, etc.

c Syncope, collapsus, hypotonie