

Tableau des vaccins concernés selon les composants en cause dans la réaction anaphylactique.

Composants en cause dans la réaction anaphylactique	Vaccins concernés
Anaphylaxie lors de l'injection précédente d'un vaccin donné	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vaccin concerné</li> </ul>
Anaphylaxie suite à l'administration locale ou systémique de néomycine, de polymyxine	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hexyon<sup>®</sup>, Infanrix-Hexa<sup>®</sup></li> <li>■ Infanrix quinta<sup>®</sup>, Pentavac<sup>®</sup></li> <li>■ Boostrixtetra<sup>®</sup>, Infanrix tetra<sup>®</sup>, Repevax<sup>®</sup>, Tetravac<sup>®</sup>, Revaxis<sup>®</sup></li> <li>■ M-M-RVAXPRO<sup>®</sup>, Priorix<sup>®</sup>,</li> <li>■ Twinrix<sup>®</sup>, Avaxim<sup>®</sup>, Havrix<sup>®</sup>, Vaqta<sup>®</sup></li> <li>■ Varilix<sup>®</sup>, Varivax<sup>®</sup></li> </ul>
Anaphylaxie après ingestion de levure	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ HBVAXPRO<sup>®</sup>, Engerix-B<sup>®</sup>, Fendrix<sup>®</sup></li> <li>■ Infanrix-Hexa<sup>®</sup>; Hexyon<sup>®</sup></li> <li>■ Twinrix<sup>®</sup></li> <li>■ Gardasil<sup>®</sup></li> </ul>
Anaphylaxie après ingestion de gélatine	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ M-M-RVAXPRO<sup>®</sup></li> <li>■ Fluenztetra<sup>®</sup></li> </ul>
Anaphylaxie après injection de l'anatoxine diphtérique <i>(CRM-197)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vaccin contenant une valence diphtérique</li> <li>■ Prévenar 13<sup>®*</sup></li> <li>■ Menveo<sup>®*</sup>, Menjugate<sup>®*</sup></li> </ul>
Anaphylaxie après injection de l'anatoxine tétanique	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vaccin contenant une valence tétanique</li> <li>■ Neisvac<sup>®**</sup>, Nimenrix<sup>®**</sup></li> </ul>

\* Vaccin contenant de l'anatoxine diphtérique.

\*\* Vaccin contenant de l'anatoxine tétanique.