

Tableau 1 : Efficacité du Zostavax® sur l'incidence du zona et des douleurs post zostériennes.

Classes d'âge	Réduction en % de l'incidence du Zona (IC* 95%)	Réduction en % du « poids de la douleur » (IC* 95%)	Réduction en % de l'incidence des DPZ (IC* 95%)
Données de l'étude pivot SPS (environ 3 ans de suivi)			
Tous les patients	51,3 (44,2 - 55,6)	61,1 (51,1 - 69,1)	66,5 (47,5 - 79,2)
60-69 ans	63,9 (55,5 - 70,9)	65,5 (51,5 - 75,5)	65,7 (20,4 - 86,7)
70 ans et plus	37,6 (25,0 - 48,1)	55,4 (39,9 - 66,9)	66,8 (43,3 - 81,3)
Données de l'étude LTPS (après 10 ans de suivi)			
60-69 ans	20,2 (6,7 - 32,2)	32,5 (16,6 - 45,4)	17,1 (-31,0 - 50,9)
70 ans et plus	22,4 (6,0 - 36,6)	42,5 (27,5 - 54,4)	49,7 (15,6 - 72,5)

*IC = Intervalle de confiance à 95%

Source: Haut Conseil de la santé publique. Vaccination des adultes contre le zona avec le vaccin Zostavax®.